

Диагностические критерии для СКВ EULAR/ACR 2019

Клинические проявления и критерии	Значимость	Иммунологические проявления и критерии	Значимость
Основной классификационный критерий АНФ в титре $\geq 1:80^*$ на культуре клеток HEp-2 или эквивалентный положительный тест			
Конституциональные критерии Лихорадка	2	Антитела к фосфолипидам Антикардиолипиновые антитела или анти- $\beta 2GP1$ или волчаночный антикоагулянт	2
Поражения кожи Нерубцовая алопеция	2	Компоненты комплемента Низкий уровень C3 или C4 Низкий уровень C3 и C4	3 4
Язвы в ротовой полости	2		
Подострая кожная или дискоидная волчанка	4		
Острая кожная волчанка	6		
Артрит Синовит, характеризующийся припухлостью суставов или выпотом с поражением двух и более суставов или скованностью двух и более суставов 30 и более минут по утрам	6	Высокоспецифичные антитела Антитела к двуспиральной ДНК [†] Анти-Smith антитела	6 6
Нейропсихические проявления Делирий	2		
Психозы	3		
Эпилептический приступ	5		
Серозиты Плевральный или перикардальный выпот	5		
Острый перикардит	6		
Гематологические проявления Лейкопения	3		
Тромбоцитопения	4		
Аутоиммунный гемолиз	4		
Почечные проявления Протеинурия $>0,5$ г/24 часа	4		
Люпус-нефрит на биопсии, класс II или V	8		
Люпус-нефрит на биопсии, класс III или IV	10		

Системная красная волчанка определяется при значении суммы критериев 10 и более, если так же имеется основной классификационный критерий

Дополнительные пункты

- Не принимайте во внимание данные критерии, если более вероятна иная, отличная от СКВ, трактовка симптомов
- Если критерий был зафиксирован по крайней мере один раз, то этого достаточно
- При оценке каждого из показателей суммироваться должен показатель только с наивысшим значением

- Требуется по крайней мере один клинический критерий
- Критерии не должны проявляться одновременно



Повреждение органов при СКВ

Система органов	Повреждение
Повреждение органов зрения	Катаракта; Ретинопатия; Атрофия зрительного нерва
Психоневрологические нарушения	Когнитивные нарушения или острый психоз; Поперечный миелит; Судороги, для лечения которых требуется не менее 6 месяцев; Краниальная или периферическая нейропатия; Острое нарушение мозгового кровообращения/инсульт
Повреждение почек	Расчетная скорость клубочковой фильтрации (pСКФ) или скорость клубочковой фильтрации (СКФ) < 50% Протеинурия ≥ 3,5 г/24 часа; Нарушение функции почек; Терминальная стадия хронической почечной недостаточности (ТХПН)
Поражение органов дыхания	Легочная гипертензия; Пневмофиброз; Уменьшение легкого на рентгенограмме; Фиброз плевры; Инфаркт легкого
Сердечно-сосудистые нарушения	Стенокардия или коронарное шунтирование; Инфаркт миокарда; Кардиомиопатия; Клапанный порок; Перикардит
Нарушение работы периферических сосудов	Перемежающаяся хромота на протяжении 6 месяцев; Незначительная потеря тканей; Тромбоз вен
Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта	Инфаркт или резекция кишечника; Мезентериальная недостаточность; Хронический перитонит; Хирургия стриктуры или верхних отделов желудочно-кишечного тракта
Поражение скелетно-мышечной системы	Атрофия или слабость мышц; Деформирующий или эрозивный артрит; Остеопороз с переломом; Остеонекроз; Остеомиелит
Поражения кожи	Рубцовая алопеция; Обширные рубцы; Изъязвление кожи
Нарушение со стороны репродуктивной системы	Преждевременная гонадная недостаточность
Эндокринные нарушения	Сахарный диабет
Злокачественные новообразования	Любой вид раковой опухоли

Повреждение органов

Необратимое изменение, не связанное с активным воспалением, возникающее с момента появления волчанки, подтвержденное данными клинического анализа и сохраняющееся на протяжении периода не менее 6 месяцев. Этот индекс повреждения для СКВ учитывает повреждения, возникающие у пациентов с СКВ, независимо от их причины.

Оценка повреждения органов необходимо для определения тяжести СКВ и выбора терапии.

